

El ácido salicílico un betahidroxiácido de composición al 20% es un peeling de potencia media con propiedades antibacterianas naturales, ideal para combatir imperfecciones y desobstruir los poros con el uso repetido. Adecuado para pieles grasas y con acné, es apto para especialistas con experiencia en su aplicación y seguro para todo tipo de piel.



**Ingrediente Activo:** Ácido Salicílico

**Potencia:** Media - 20%

**Otros ingredientes:** Propilenglicol, Pentilenglicol, Alcohol denat.

**Presentación:** 30 mL

## PRINCIPALES APLICACIONES

- Piel grasa, con tendencia acneica, comedones activos, imperfecciones seborreicas.
- Piel con poros dilatados.
- Piel con textura áspera, queratinización folicular.
- Áreas del cuerpo con exceso de grasa o imperfecciones en espalda, hombros, pecho, codos, rodillas
- Posible su aplicación en fototipos I a IV de Fitzpatrick se benefician más con menor riesgo
- Para fototipos V-VI se debe usar con más precaución por riesgo de hiperpigmentación post-inflamatoria.

## CONTRAINDICACIONES:

- Alergia o hipersensibilidad al ácido salicílico o a salicilatos.
- Dermatitis activas inflamatorias severas no controladas como brotes de acné con pus y rosácea activa).
- Historia de reacciones queloides o pigmentaciones post-inflamatorias severas especialmente en fototipos altos.
- Uso reciente de isotretinoína sistémica (generalmente menos de 6-12 meses desde su suspensión).
- Embarazo o lactancia: aunque algunos estudios lo aceptan en concentraciones bajas y tópicas, 20% puede considerarse de riesgo; se debe valorar médico.
- Piel muy fina, frágil, con barrera cutánea comprometida o tras tratamientos agresivos recientes, radioterapia, exfoliaciones recientes.
- Infecciones cutáneas activas, heridas o quemaduras en la zona a tratar.
- Historia de hipersensibilidad química o irritabilidad excesiva.

## PROTOCOLO

1

### Evaluación previa del paciente

- Historia clínica: tratamientos recientes, uso de retinoides, isotretinoína, alergias, fototipo.
- Realizar prueba de tolerancia ("patch test") si el paciente no ha usado al ácido anteriormente.

2

### Preparación de la piel

- Limpieza profunda con gel limpiador syndet pH fisiológico.
- Secado con gasa.
  - Opcional: desengrasado con alcohol isopropílico o solución desengrasante suave si la piel es muy grasa.

3

### Protección de zonas sensibles

- Aplicar barrera oclusiva en labios, contorno de ojos, pliegues nasolabiales si se desea.



Labios

Ojos, párpados

Pliegues Nasolabiales



4

### Aplicación del Ácido

- Usar pincel o brocha abanico.
- Colocar de 1-2 mL del peeling en bowl
- Ayudándote de brocha plana abanico inicia la aplicación en el siguiente orden:
  - Frente → mejillas → nariz → mentón.
- Extiende una capa fina, uniforme, evitando mucosas y lesiones.
- Trabaja rápido, sin fricción.

1 mL aprox.



2 mL aprox.



## 5

### Tiempos de Exposición

- Con ayuda de un cronómetro digital o análogo, toma el tiempo preciso de aplicación
- Registra el tiempo en la ficha de paciente para llevar el monitoreo preciso de cada sesión
- Asegúrate de tener listo y a la mano la **Solución Neutralizante** para desactivar el ácido

TIPO DE PIEL	TIEMPO SUGERIDO	SIGNOS A VIGILAR
Piel sensible	2-4 minutos	Ardor leve-moderado, enrojecimiento inicial. Evitar que ardor se mantenga, retirar si hay intenso escozor. Nada de "frosting" profundo.
Piel mixta	5-7 minutos	Enrojecimiento notable, sensación de calor, posibilidad de un frosting leve. Observa tolerancia, si sobrepasa confort se neutraliza.
Piel resistente	7- 10 minutos	Frosting visible, eritema marcado, posible descamación mayor en días posteriores. Vigilar pigmentaciones en fototipos oscuros.

**NOTA IMPORTANTE:** El tiempo de exposición prolongado, mayor a 7 minutos, incluso en pieles resistentes y especialmente con potencias altas, debe ser monitoreado muy de cerca, considerando el alto riesgo de quemadura química

Es habitual que el paciente perciba ardor, escozor o picazón, con variación en la tolerancia individual durante el tiempo de reposo o al momento de la neutralización. Para valorar la intensidad, indíquele calificar la molestia en una escala del 0 (sin molestias) al 10 (máxima intensidad). **Si alcanza 8-10, el procedimiento debe suspenderse aun cuando no se observen los signos clínicos esperados.**

## 6

### Monitoreo durante la exposición

- Observar sensación de quemazón, ardor, enrojecimiento.
- Vigilar por aparición de "frosting" leve/moderado (blanqueamiento leve) si la piel resistente lo permite.

## 7

### Neutraliza y Retira

- Con ayuda de gasa y agua fría enjuaga la piel del paciente para mayor confort
- Aplica suficiente bruma de **Solución Neutralizante** sobre todo el área.
- Dejar reposar 30 segundos.
- Seca nuevamente el área con gasa y toques suaves evitando fricción.

← PUEDES INVERTIR

**NOTA:** Aunque el ácido salicílico puede ser auto-neutralizante en formulaciones típicas; en vehículos especializados como el de nuestra fórmula puede permanecer activo por más tiempo; por ello la neutralización debe considerarse como opcional según exposición, área tratada, tolerancia individual y fototipo.

**Sensaciones de ardor, picor o calor pueden llegar a sentirse al momento de la neutralización del ácido. Es totalmente normal y debe calmarse al paso de los minutos.**

8

## Potencializa

Aplica de manera tópica con un suave pero consistente masaje sobre toda la zona alguna de las siguientes ampollas para potencializar los efectos del tratamiento:

- Aplica vía tópica Ampolleta **Tx-ACNE** ideal para potenciar efecto anticomedónico, controlar sebo y disminuir inflamación.
- En piel mixta con algo de pigmentación posterior, podría complementarse con **Tx-MELANIN** para prevenir hiperpigmentación post-peel.

9

## Finaliza

- Siempre aplicar **Factores Hidratantes Naturales** después del peeling para restaurar barrera y minimizar irritación.

10

## PROTEGE DE RAYOS UVA/UVB

- Cierra el protocolo protegiendo la piel con la aplicación de SOLARIA FPS 50+ después del peeling para evitar sensibilidades y daño solar indeseado.

## Rutina Post-peeling en Casa

- Limpieza: **Gel limpiador** syndet pH fisiológico, mañana y noche.
- Hidratación: Suero **AQUA** hidratante para rehidratar la piel y ayudar a recuperación de barrera.
- Refuerzo y prevención:
  - **Suero ANTIOX** para combatir radicales libres y prevenir pigmentaciones.
  - **Gel Balance** en zonas con brotes o sebo excesivo en piel mixta / acnéica
- Protección solar estricta: **Solaria**, factor alto (SPF 50+), reaplicar cada 2-3 h en exteriores.

## SUGERENCIAS PREVIAS AL TRATAMIENTO

- Evitar exposición solar fuerte durante 2 semanas previas.
- Suspender la depilación, remoción de vello y decoloración 2 semanas antes del procedimiento.
- Los autobronceadores y camas de bronceado
- La hidroquinona debe discontinuarse previo al tratamiento.
- Los peelings químicos y la terapia de luz pulsada intensa (IPL) requieren una pausa de 2 semanas antes del tratamiento, recordando que los peelings necesitan un mínimo de 2 semanas de separación entre procedimientos.
- Las lesiones como herpes labial deben estar completamente curadas 2 semanas antes del tratamiento.
- Los productos y tratamientos exfoliantes deben suspenderse 48 horas antes del procedimiento.
- En cuanto a los ácidos AHA/BHA y retinoides, su uso debe ser evaluado por el profesional tratante.

## CUIDADOS POST- TRATAMIENTO

- Evitar exposición solar directa.
- Evitar saunas, baños muy calientes, exfoliaciones mecánicas o químicas por al menos 5-7 días.
- No maquillaje hasta al menos 24 h después
- Usar fórmulas suaves, sin fragancias o irritantes.