

Peeling químico exfoliante superficial-medio que combina cuatro alfa-hidroxiácidos con acción renovadora, despigmentante y antioxidante, mejorando textura, tono y luminosidad cutánea.



Ingrediente Activo: Ácido Láctico, Ácido Glicólico, Ácido Cítrico, Ácido tartárico

Potencias: Baja 20% , Media 30 % y Alta 50%

Otros ingredientes: Agua, Pentilenglicol, Glicerina, Citrato de Sodio, Goma Xantana.

Presentación: 30 mL

PRINCIPALES APLICACIONES

- Mejora de textura irregular, opacidad, tono apagado.
- Hiperpigmentaciones superficiales, manchas postinflamatorias leves.
- Líneas finas y fotoenvejecimiento ligero-moderado.
- Ideal para piel mixta a seca para mejorar luminosidad; para piel grasa, combinado con agentes seborreguladores o usos alternados.
- Exfoliación química más suave que los AHA por si solos, al beneficiarse del efecto sinérgico de cada ácido (p.ej. glicólico - exfoliación, láctico - hidratación & relación con barrera, cítrico/tartárico - aclarantes ligero, promueven renovación).
- Fototipos I-III toleran potencias mayores (30-50%) con menor riesgo; fototipos IV-VI deben iniciarlo con potencias bajas (20%) y buen manejo de protección solar, posibles pruebas de tolerancia.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a cualquiera de los ácidos implicados (láctico, glicólico, cítrico, tartárico).
- Piel con barrera cutánea dañada, piel muy fina, quemaduras solares recientes, tratamientos agresivos recientes (láser, dermoabrasión, fuertes exfoliaciones).
- Rosácea activa, eccema, psoriasis inflamatoria activa, dermatitis.
- Uso reciente de isotretinoína sistémica (6-12 meses).
- Embarazo / lactancia: usar con precaución y preferir concentraciones bajas.
- Fototipos altos con historial de hiperpigmentación postinflamatoria sin manejo adecuado.
- Uso simultáneo de otros exfoliantes fuertes, retinoides de alta potencia, salvo supervisado.

PROTOCOLO

- 1 Evaluación previa del paciente**
- Historia clínica: tratamientos recientes, uso de retinoides, isotretinoína, alergias, fototipo.
 - Realizar prueba de tolerancia ("patch test") si el paciente no ha usado al ácido anteriormente.

- 2 Preparación de la piel**
- Limpieza gentil con Gel limpiador syndet pH fisiológico.
 - Secado con gasa.
 - Opcional: desengrasado con alcohol isopropílico o solución desengrasante suave si la piel es muy grasa.

- 3 Protección de zonas sensibles**
- Aplicar barrera oclusiva en labios, contorno de ojos, pliegues nasolabiales si se desea.



Labios


Ojos, párpados

Pliegues Nasolabiales



- 4 Aplicación del Ácido**
- Las variantes de la potencia disponible del ácido quedan a consideración, supervisión y buen manejo del profesional sin olvidar el riesgo de quemadura química severa en potencia alta del ácido.

- Colocar de 1–2 mL del peeling en bowl
- Ayudándote de brocha plana abanico inicia la aplicación en el siguiente orden:
 - Frente → mejillas → nariz → mentón.
- Extiende una capa fina, uniforme, evitando mucosas y lesiones.
- Trabaja rápido, sin fricción.



5

Tiempos de Exposición

POTENCIA	TIPO DE PIEL	TIEMPO SUGERIDO	SIGNOS A VIGILAR
20%	SENSIBLE	2 - 4 min	Enrojecimiento leve, calor, ardor moderado, tirantez leve. No frosting marcado. Descamación suave los siguientes 1-2 días. Buen confort post-peel, sin sensación de incomodidad
	MIXTA	5 - 7 min	
	RESISTENTE	Máximo 10 min	
30%	SENSIBLE	2 - 4 min	Enrojecimiento más evidente, ardor, calor, posible tirantez más marcada. Descamación moderada los siguientes 1- 5 días. Posible frosting en zonas gruesas.
	MIXTA	5 - 7 min	
	RESISTENTE	Máximo 10 min	
50%	SENSIBLE	1 - 2 min	Rojez marcada, calor importante, ardor fuerte. Posible frosting leve-moderado. Descamación segura en días posteriores. Riesgo de irritación prolongada si no se maneja bien.
	MIXTA	2 - 4 min	
	RESISTENTE	Máximo 7 min	

NOTA IMPORTANTE: El tiempo de exposición prolongado, mayor a 7 minutos, incluso en pieles resistentes y especialmente con potencias altas, debe ser monitoreado muy de cerca, considerando el alto riesgo de quemadura química

Es habitual que el paciente perciba ardor, escozor o picazón, con variación en la tolerancia individual durante el tiempo de reposo o al momento de la neutralización. Para valorar la intensidad, indíquele calificar la molestia en una escala del 0 (sin molestias) al 10 (máxima intensidad). **Si alcanza 8-10, el procedimiento debe suspenderse aun cuando no se observen los signos clínicos esperados.**

6

Monitoreo durante la exposición

- Observar sensación de quemazón, ardor, enrojecimiento (eritema) .
- Vigilar por aparición de “frosting” leve/moderado (blaqueamiento leve) si la piel resistente lo permite.

7

Neutraliza y Retira

- Con ayuda de gasa y agua fría enjuaga la piel del paciente para mayor confort.
- Aplica suficiente bruma de **Solución Neutralizante** sobre todo el área.
- Dejar reposar 30 segundos.
- Seca nuevamente el área con gasa y toques suaves evitando fricción.

← PUEDES INVERTIR

Sensaciones de burbujeo, ardor, picor o calor pueden llegar a sentirse al momento de la neutralización del ácido. Es totalmente normal y debe calmarse al paso de los minutos.

8

Potencializa

Maximiza el tratamiento exfoliante / peeling con alguna de las siguientes ampollas. Aplica de manera tópica con un suave pero consistente masaje sobre toda la zona.

- **Para potencia al 20%** → Ampolleta Tx-GLOW para uniformar tono y dar luminosidad suave. / HYDRA para hidratación barrera.
- **Para potencia al 30%** → Ampolleta Tx-MELANIN si hay manchas, para prevenir pigmentación post-inflamatoria; Ampolleta Tx-AGELESS si también se busca estímulo de colágeno y recuperación más profunda.
- **Para potencia al 50%** → combinación de Tx-AGELESS para favorecer reparación; también con Ampolleta Tx-GLOW o Tx-MELANIN según objetivo (iluminación vs despigmentación).

9

Finaliza

- Siempre aplicar **Factores Hidratantes Naturales** después del peeling para restaurar barrera y minimizar irritación.

10

PROTEGE DE RAYOS UVA/UVB

- Cierra el protocolo protegiendo la piel con la aplicación de SOLARIA FPS 50+ después del peeling para evitar sensibilidades y daño solar indeseado.

Rutina Post-peeling en Casa

- Limpieza: **Gel limpiador** syndet pH fisiológico, mañana y noche.
- Hidratación: Suero **AQUA** hidratante para rehidratar la piel y ayudar a recuperación de barrera.
- Refuerzo y prevención:
 - **Suero ANTIOX** para combatir radicales libres y prevenir pigmentaciones.
 - **Gel Balance** en zonas con brotes o sebo excesivo en piel mixta / acnéica
- Protección solar estricta: **Solaria**, factor alto (SPF 50+), reaplicar cada 2-3 h en exteriores.

SUGERENCIAS PREVIAS AL TRATAMIENTO

- Evitar exposición solar fuerte durante 2 semanas previas.
- Suspender la depilación, remoción de vello y decoloración 2 semanas antes del procedimiento.
- Los autobronceadores y camas de bronceado
- La hidroquinona debe discontinuarse previo al tratamiento.
- Los peelings químicos y la terapia de luz pulsada intensa (IPL) requieren una pausa de 2 semanas antes del tratamiento, recordando que los peelings necesitan un mínimo de 2 semanas de separación entre procedimientos.
- Las lesiones como herpes labial deben estar completamente curadas 2 semanas antes del tratamiento.
- Los productos y tratamientos exfoliantes deben suspenderse 48 horas antes del procedimiento.
- En cuanto a los ácidos AHA/BHA y retinoides, su uso debe ser evaluado por el profesional tratante.

CUIDADOS POST- TRATAMIENTO

- Evitar exposición solar directa.
- Evitar saunas, baños muy calientes, exfoliaciones mecánicas o químicas por al menos 5-7 días.
- No maquillaje hasta al menos 24 h después
- Usar fórmulas suaves, sin fragancias o irritantes.